



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der ergänzenden Kennzahlen
für das Erfassungsjahr 2016

Pflege: Dekubitusprophylaxe

Kennzahlen 2016

Stand: 06.04.2017

Inhaltsverzeichnis

52326: Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2	3
52327: Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3 oder nicht näher bezeichnet	5
Anhang I: Listen.....	7
Anhang II: Funktionen	8

52326: Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2016

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname**
13:DEK	Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus	M	ICD-10-GM SGB V: http://www.dimdi.de	QS_HOECHSTGRADDEK
15:DEK	War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")	M	0 = Nein: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden 1 = Ja: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden 9 = Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	QS_POA
EF*	Geburtsjahr	-	jahreswert(GEBDATUM)	QS_gebjahr
EF*	Monat des Entlassungstages	-	monat(ENTLDATUM)	QS_monatEntl
26:RST	Anzahl Datensätze	M	-	RST_ANZAHLFAELLE

* Ersatzfeld im Exportformat

** Datenfelder aus der QS-Dokumentation werden mit dem Präfix "QS" und Datenfelder aus der Risikostatistik mit dem Präfix "RST" gekennzeichnet

Berechnung

Kennzahl-ID	52326										
Bewertungsart	Quote										
Teildatensatzbezug	DEK:B (QS-Dokumentation); RST:RST (Risikostatistik)										
Zähler (Formel)	fn_DEKDatensatzPlausibel UND fn_DEKGrad_2 UND fn_DEKHoechsterErworbenerGrad UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20										
Nenner (Formel)	RST_RST_Gesamt_g20 (Nenner)										
Unterkennzahlen	<table border="1"> <tr> <td>Unterkennzahl</td> <td>RST_RST_Gesamt_g20</td> </tr> <tr> <td>Operator</td> <td>Anzahl</td> </tr> <tr> <td>Teildatensatz</td> <td>RST:RST</td> </tr> <tr> <td>Zähler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nenner</td> <td>RST_ANZAHLFAELLE WENN fn_Gesamt UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20</td> </tr> </table>	Unterkennzahl	RST_RST_Gesamt_g20	Operator	Anzahl	Teildatensatz	RST:RST	Zähler		Nenner	RST_ANZAHLFAELLE WENN fn_Gesamt UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20
Unterkennzahl	RST_RST_Gesamt_g20										
Operator	Anzahl										
Teildatensatz	RST:RST										
Zähler											
Nenner	RST_ANZAHLFAELLE WENN fn_Gesamt UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20										
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_DEKDatensatzPlausibel fn_DEKGrad_2 fn_DEKGrad_2bis4 fn_DEKGrad_3 fn_DEKGrad_4 fn_DEKGrad_nichtPOA fn_DEKGrad_nnb fn_DEKHoechsterErworbenerGrad fn_DEKnichtPOA RST:fn_Gesamt										
Verwendete Listen	@ICD_DekGrad_2 @ICD_DekGrad_3 @ICD_DekGrad_4 @ICD_DekGrad_nnb										

52327: Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3 oder nicht näher bezeichnet

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2016

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname**
13:DEK	Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus	M	ICD-10-GM SGB V: http://www.dimdi.de	QS_HOECHSTGRADDEK
15:DEK	War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")	M	0 = Nein: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden 1 = Ja: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden 9 = Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	QS_POA
EF*	Geburtsjahr	-	jahreswert(GEBDATUM)	QS_gebjahr
EF*	Monat des Entlassungstages	-	monat(ENTLDATUM)	QS_monatEntl
26:RST	Anzahl Datensätze	M	-	RST_ANZAHLFAELLE

* Ersatzfeld im Exportformat

** Datenfelder aus der QS-Dokumentation werden mit dem Präfix "QS" und Datenfelder aus der Risikostatistik mit dem Präfix "RST" gekennzeichnet

Berechnung

Kennzahl-ID	52327											
Bewertungsart	Quote											
Teildatensatzbezug	DEK:B (QS-Dokumentation); RST:RST (Risikostatistik)											
Zähler (Formel)	fn_DEKDatensatzPlausibel UND (fn_DEKGrad_3 ODER fn_DEKGrad_nnb) UND fn_DEKHoechsterErworbenerGrad UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20											
Nenner (Formel)	RST_RST_Gesamt_g20 (Nenner)											
Unterkennzahlen	<table border="1"> <tr> <td>Unterkennzahl</td> <td>RST_RST_Gesamt_g20</td> </tr> <tr> <td>Operator</td> <td>Anzahl</td> </tr> <tr> <td>Teildatensatz</td> <td>RST:RST</td> </tr> <tr> <td>Zähler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nenner</td> <td>RST_ANZAHLFAELLE WENN fn_Gesamt UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20</td> </tr> </table>		Unterkennzahl	RST_RST_Gesamt_g20	Operator	Anzahl	Teildatensatz	RST:RST	Zähler		Nenner	RST_ANZAHLFAELLE WENN fn_Gesamt UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20
Unterkennzahl	RST_RST_Gesamt_g20											
Operator	Anzahl											
Teildatensatz	RST:RST											
Zähler												
Nenner	RST_ANZAHLFAELLE WENN fn_Gesamt UND @RST_KH_ANZAHLFAELLE >= 20											
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_DEKDatensatzPlausibel fn_DEKGrad_2 fn_DEKGrad_2bis4 fn_DEKGrad_3 fn_DEKGrad_4 fn_DEKGrad_nichtPOA fn_DEKGrad_nnb fn_DEKHoechsterErworbenerGrad fn_DEKnichtPOA RST:fn_Gesamt											
Verwendete Listen	@ICD_DekGrad_2 @ICD_DekGrad_3 @ICD_DekGrad_4 @ICD_DekGrad_nnb											

Anhang I: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
@ICD_DekGrad_2	ICD	Dekubitus, Grad / Kategorie 2	L89.1%
@ICD_DekGrad_3	ICD	Dekubitus, Grad / Kategorie 3	L89.2%
@ICD_DekGrad_4	ICD	Dekubitus, Grad / Kategorie 4	L89.3%
@ICD_DekGrad_nnb	ICD	Dekubitus, Grad / Kategorie nicht näher bezeichnet	L89.9%

Anhang II: Funktionen

Funktion	Feldtyp	Beschreibung	Script
fn_alter	integer	Alter des Patienten (Differenz aus aktuellem Jahr und Geburtsjahr)	@Auswertungsjahr - QS_gebjahr
fn_DEKDatensatzPlausibel	boolean	Der DEK-Datensatz ist plausibel: 1. Das Entlassungsjahr liegt im Erfassungsjahr 2016 2. Alter >= 20 (Differenz aus aktuellem Jahr und Geburtsjahr) 3. HOECHSTGRADDEK entspricht den ICD-Kodes L89.1*, L89.2*, L89.3* oder L89.9*	Rechts(QS_monatEntl,4) = @Auswertungsjahr UND fn_alter >= 20 UND fn_DEKGrad_2bis4
fn_DEKGrad_2	boolean	Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie 2 - die Angabe zu HOECHSTGRADDEK entspricht den ICD-Kodes L89.1*	QS_HOECHSTGRADDEK LIKE @ICD_DekGrad_2
fn_DEKGrad_2bis4	boolean	Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnet - die Angabe zu HOECHSTGRADDEK entspricht den ICD-Kodes L89.1*, L89.2*, L89.3* oder L89.9*	fn_DEKGrad_2 ODER fn_DEKGrad_3 ODER fn_DEKGrad_4 ODER fn_DEKGrad_nnb
fn_DEKGrad_3	boolean	Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie 3 - die Angabe zu HOECHSTGRADDEK entspricht den ICD-Kodes L89.2*	QS_HOECHSTGRADDEK LIKE @ICD_DekGrad_3
fn_DEKGrad_4	boolean	Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie 4 - die Angabe zu HOECHSTGRADDEK entspricht den ICD-Kodes L89.3*	QS_HOECHSTGRADDEK LIKE @ICD_DekGrad_4

Funktion	Feldtyp	Beschreibung	Script
fn_DEKGrad_nichtPOA	integer	Hierarchisierung aller neu erworbenen Dekubitalulcera; Ein Dekubitus mit dem Grad/der Kategorie 3 und dem Grad/der Kategorie nicht näher bezeichnet werden als gleichrangig betrachtet	<pre> PROZEDUR DEKGrad_nichtPOA; VAR GradNichtPOA; { PRUEFUNG{ WENN fn_DEKGrad_2 UND fn_DEKnichtPOA DANN GradNichtPOA := 2; WENN (fn_DEKGrad_3 ODER fn_DEKGrad_nnb) UND fn_DEKnichtPOA DANN GradNichtPOA := 3; WENN fn_DEKGrad_4 UND fn_DEKnichtPOA DANN GradNichtPOA := 4; SONST GradNichtPOA := LEER ; }; ERGEBNIS := GradNichtPOA; } </pre>
fn_DEKGrad_nnb	boolean	Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet - die Angabe zu HOECHSTGRADDEK entspricht den ICD-Kodes L89.9*	QS_HOECHSTGRADDEK LIKE @ICD_DekGrad_nnb
fn_DEKHoechsterErworbenerGrad	boolean	Der Dekubitus entspricht dem höchsten Grad/der höchsten Kategorie aller neu erworbenen Dekubitalulcera	fn_DEKGrad_nichtPOA = Maximum(_B:fn_DEKGrad_nichtPOA)
fn_DEKnichtPOA	boolean	Die Angabe zu POA ist auf Basis des DEK-Datensatzes: 0 = nein oder 9 = unbekannt	QS_POA IN (0,9)
RST:fn_Gesamt	boolean		Wahr